

Instrucciones de preparación para la colonoscopia usando Sutab

Nosotros nos pondremos en contacto con usted al mediodía del día hábil anterior a su procedimiento para informarle la hora de su procedimiento. Si nosotros no lo/a contactamos a esta hora, por favor llame al (920) 884-3400 antes de las 4:00 p.m.

Por favor siga estas instrucciones cuidadosamente mientras se prepara para su examen.

Organice a un conductor/a designado para el día del examen

Un familiar o amigo/a responsable **DEBE** recogerlo/a de su procedimiento. **NO** está permitido que usted conduzca, tome un taxi, autobús o Uber. **Si usted no tiene un conductor/a responsable (familiar o amigo/a) que lo/a lleve a su casa, su examen no podrá realizarse y se cancelará.**

Si usted es diabético/a,

- Comuníquese con el médico prescriptor o con su médico de atención primaria si tiene alguna pregunta sobre los medicamentos para la diabetes orales o inyectables.
- Tome líquidos claros **regulares** el día antes de su colonoscopia en lugar de líquidos sin azúcar o de dieta.

Medicamentos

Si usted está tomando alguno de los siguientes medicamentos y aún no ha recibido instrucciones, por favor llame a nuestro consultorio para recibir más instrucciones al (920) 429-1700. Usted solo debe abstenerse de tomar aspirina infantil la mañana del procedimiento.

- Coumadin/Warfarin/Jantoven
- Xarelto/Rivaroxaban
- Lovenox/Enoxaparin
- Savaysa/Edoxaban
- Pradaxa/Dabigatran
- Eliquis/Apixaban
- Brilinta/Ticagrelor
- Effient/Prasurgel
- Plavix/Clopidogrel

Cinco días antes de su colonoscopia

Recoja la receta de la preparación intestinal en su farmacia local preferida. Su receta fue enviada a la farmacia cuando usted programó su procedimiento. Si la receta es demasiado costosa, por favor llame a nuestro consultorio para solicitar una alternativa.

Compre tabletas de simeticona en su farmacia. Estas se venden sin receta bajo los nombres de Gas X o Mylanta Gas, tabletas Extra Fuertes de 125mg (se puede usar simeticona de marca o de marca genérica). Usted va a necesitar 4 tabletas en total.

Si usted programó su procedimiento hace más de 10 días, llame a su farmacia con anticipación para asegurarse de que aún tengan la receta para usted. Por favor llame a nuestro consultorio al (920) 429-1700 si su farmacia no tiene la receta.

Además, dentro de los cinco días antes de su procedimiento,

- Si pasan tres días sin que usted tenga una evacuación de los intestinos, compre 18 tabletas de sen (8.6 mg) que se venden sin receta médica.
- **NO** tome medicamentos para detener la diarrea tales como Imodium, Kaopectate o Pepto Bismol.
- **NO** tome suplementos de fibra tales como Metamucil, Citrucel o Perdiem.
- **NO** tome productos que contengan hierro tales como suplementos multivitamínicos.

Tres días antes de su colonoscopia

- **NO** coma alimentos con alto contenido de fibra tales como palomitas de maíz, frijoles, semillas (lino, girasol, quínoa), pan multigrano o nueces.
- Limite la ensalada/vegetales, frutas frescas y secas a 1-2 porciones por día.
- Evite cualquier fruta/vegetal con semillas tales como tomates o fresas. Evite el elote.

Un día antes de su colonoscopia

- **Sólo beba líquidos claros TODO EL DIA antes de su procedimiento. NO coma ni beba ningún alimento sólido.**
- Beba por lo menos ocho onzas de líquidos claros cada hora después de despertarse. (Consulte la Lista de Compras para la Colonoscopia).
- **Evite todos los líquidos rojos y morados.**
- No beba alcohol el día antes o el mismo día del procedimiento.

Cuando debe beber la preparación intestinal

- La tarde antes de su procedimiento (a partir de las 2:00 p.m. a las 5:00 p.m.), abra un frasco de 12 tabletas.
- No triture ni corte ninguna tableta. Las tabletas deben tomarse enteras.
- Llene el recipiente provisto con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado).
- Tome una tableta cada dos a tres minutos con un sorbo de agua y beba la cantidad completa durante los siguientes 20 a 30 minutos.
- Espere 30 minutos.
- Beba 32 onzas de agua durante la siguiente hora.

Si pasan tres días sin que usted tenga una evacuación de los intestinos, tome tabletas de sen el día antes de su colonoscopia.

- Tome 6 tabletas de sen a las 9:00 a.m.
- Tome 6 tabletas de sen a la 1:00 p.m.
- Tome 6 tabletas de sen a las 6:00 p.m.

La mañana de su colonoscopia

- **Cuatro horas antes de su hora de llegada**, tome dos tabletas de simeticona y reinicie la preparación del laxante, como se indicó anteriormente.
- Tome las últimas dos tabletas de simeticona con las últimas 32 onzas de agua.
- No beba nada más dos horas antes de su hora de llegada.
- No mastigar chicle ni comer mentas o caramelos/dulces duros.
- Usted **DEBE** beber todo el laxante para asegurarse que su colon esté limpio de excremento. Si su excremento no es de color amarillo claro podría ser necesario reprogramar su procedimiento.
- Absténgase de tomar todos los medicamentos recetados y sin receta médica la mañana del procedimiento, excepto los medicamentos para la presión arterial o los anticonvulsivos. Usted puede usar gotas para los ojos e inhaladores como de costumbre.

- Es política del hospital que cualquier mujer Esta prueba se le administrará en el hospital.
- Si su procedimiento está programado a las 12:00 p.m. o más tarde, usted puede beber líquidos claros al despertarse, hasta que empiece la preparación del colon.
- Es importante que usted **no beba nada más una hora antes de su hora de llegada.**
- A su llegada al hospital, **regístrese en el departamento de registracion ubicado en el primer piso.**

Artículos de comodidad

Usted puede experimentar irritación de la piel alrededor del ano debido al paso del excremento líquido. Siga estas recomendaciones para prevenir y tratar la irritación de la piel:

- Aplique la pomada Vaseline o Desitin en la piel alrededor del ano antes de tomar el medicamento de la preparación intestinal.
- Limpie la piel después de cada evacuación de los intestinos con toallitas húmedas desechables en lugar de papel higiénico.
- La loción de limpieza higiénica Balneol puede ser aplicada en la piel irritada entre las evacuaciones de los intestinos y al acostarse para mayor comodidad.

Experimentando problemas

Si usted siente náuseas o vomito mientras bebe la preparación intestinal, espere 30 minutos antes de beber más líquido y empiece con pequeños sorbos de la solución. Alguna actividad, como caminar, puede ayudar a disminuir las náuseas que usted siente. Si las náuseas persisten o si usted tiene alguna pregunta adicional, por favor llame a su médico gastroenterólogo al (920) 429-1700 o al número gratuito (888) 277-3832. Hay una enfermera disponible 24 horas al día.

Si usted necesitare reprogramar

Se prefieren las cancelaciones con 48 horas de anticipación.

Si su procedimiento está programado en el:

- Centro de Cirugía Ambulatoria de Prevea, por favor llame al (920) 272-3648 para reprogramar.
- HSHS Centro Médico del Hospital St. Mary's o Hospital St. Vincent, por favor llame al (920) 433-8329 de lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m. para reprogramar.
- HSHS Hospital St. Clare Memorial, por favor llame al (920) 846-8053 para reprogramar.